

### Samenstelling

Kokosolie (verfijnd), eipoeder, plantaardig vet (raap- en palmolie), propyleenglycol.

### Analytische bestanddelen

Ruw eiwit.....	8,10%
Ruw vet.....	80,60%
Ruwe celstof.....	0,20%
Ruwe as.....	2,60%
Vocht.....	0,10%
Natrium.....	0,10%
Lysine.....	0,60%
Methionine.....	0,30%

### Toevoegingsmiddelen per liter

#### Vitaminen

3a672b Vitamine A.....	170.000 IE
3a700i Vitamine E.....	3.750 mg
3a700ii Vitamine E.....	200 mg
3a315 Niacinamide.....	1.250 mg

#### Antioxidanten

1b320 Butylhydroxyanisool.....	230 mg
E 310 Propylgallaat.....	230 mg

#### Darmflorastabilisatoren

4b1700i Bacillus subtilis (DSM 5750), Bacillus licheniformis (DSM 5749) in verhouding 1:1 40 x 10<sup>9</sup> KVE/kg

### Gebruiksaanwijzing en dosering

Schudden voor gebruik.

Pasgeboren biggen: 2-4 ml (1-2x pompen) oraal toedienen direct na de geboorte. Bij zwakke biggen nogmaals 2 ml oraal toedienen op dag 2.

### Bewaaraadvies

Sluit de verpakking na gebruik goed af. In gesloten verpakking op een droge, koele en donkere plaats bewaren. De productveiligheid kan alleen worden gegarandeerd wanneer het product op de juiste manier wordt bewaard.

### Erkenningsnr. Producent

No agrément du producteur  
α DE NI 400036

PDV103322

GMP+FSA geborgd  
Garanti GMP+FSA  
GMO controlled



250 ml

# Kick

## Vloeibaar aanvullend diervoeder voor biggen

## Aliment complémentaire liquide pour les porcelets



### Composition

Huile de coco (raffinée), poudre d'oeuf, graisse végétale (huile de colza et de palme), propylène glycol.

### Constituants analytiques

Protéines brutes.....	8,10%
Matières grasses brutes.....	80,60%
Cellulose brute.....	0,20%
Cendres brutes.....	2,60%
Humidité.....	0,10%
Sodium.....	0,10%
Lysine.....	0,60%
Méthionine.....	0,30%

### Additifs par litre

#### Vitamines

3a672b Vitamine A.....	170.000 UI
3a700i Vitamine E.....	3.750 mg
3a700ii Vitamine E.....	200 mg
3a315 Niacinamide.....	1.250 mg

#### Antioxydants

1b320 Hydroxyanisole butylé....	230 mg
E 310 Gallate de propyle.....	230 mg

#### Stabilisateurs de la flore intestinale

4b1700i Bacillus subtilis (DSM 5750), Bacillus licheniformis (DSM 5749) en rapport 1: 1 (E1700) 40 x 10<sup>9</sup> UFC/kg

### Mode d'emploi et Dosage

Agiter avant utilisation.

Porcelets nouveau-nés: Administrer 2-4 ml (1-2x pompage) par voie orale immédiatement après la naissance. Pour les porcelets faibles, administrer 2 ml supplémentaires par voie orale le deuxième jour.

### Conditions de stockage

Fermer l'emballage hermétiquement après utilisation. Conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la lumière. La sécurité du produit ne peut être garantie qu'avec un stockage adéquat.

### Chargenr.

Ten minste houdbaar tot /  
Date de durabilité

Topro: registered trademark of

**Farmula**  
farming forward

Farmula B.V.

Sluiskolk 3-5  
7681 KC Vroomshoop NL  
info@topro.nl www.topro.nl